

Modélisation numérique Océan/Atmosphère

Introduction

Frédéric Hourdin

Laboratoire de Météorologie Dynamique / IPSL / UPMC


Responsable du développement du modèle global atmosphérique LMDZ

<http://www.lmd.jussieu.fr/~hourdin/COURS/ModnumOA/2023/>

frederic.hourdin@lmd.ipsl.fr

1. Des modèles parmi les modèles
2. Les modèles de circulation générale
3. Les modèles et leur utilisation

Les 5 couches/mondes de la modélisation numérique



Les 5 mondes de la modélisation numérique

Exemple : mouvements turbulents

Les modèles avant l'ordinateur

Le monde des phénomènes
tempêtes, cycle saisonnier des températures, réchauffement climatique




Mouvements de l'air désordonnés à petite échelle, bourrasques de vent.
... vus par Van Gogh



Le monde des théories
Mécanique des fluides, circulation générale, échange rayonnement-matière, effet de serre, thermodynamique, *fonctionnement d'un ensemble de nuages*



Mélange d'une espèce q (vapeur d'eau, polluant) émise en surface par des mouvements turbulents de l'air



Le monde des équations
Traduction mathématique de la physique, ex : Navier-Stokes
transfert radiatif
modèle statistique de nuage

$$\rho \frac{D\vec{V}}{Dt} = -\nabla p + \rho \vec{g} + \mu \nabla^2 \vec{V}$$

$$\mu \frac{\partial I_V(r, \mu)}{\partial r} + \frac{1 - \mu^2}{r} \frac{\partial I_V(r, \mu)}{\partial \mu} = -\kappa_V(r) I_V(r, \mu) - \bar{s}_V(r) I_V(r, \mu) + \eta_V^{ind}(r) I_V(r, \mu) + \eta_V^{sp}(r)$$

$$+ \frac{1}{4\pi} \int_{-1}^{+1} \int_0^{2\pi} I_V(r, \mu') s_V(r, \mu, \mu'; \phi, \phi') d\mu' d\phi'$$


$$\alpha_c = \int_0^\infty Q(s) ds$$

$$Q(s) = (1 - a_{th}) f(s, \delta_{ccc}, \sigma_{cny}) + a_{th} f(s, \delta_{th}, \sigma_{th})$$


$$f(s, \delta, \sigma_s) = \frac{1}{\sigma_s \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(s - \delta)^2}{2\sigma_s^2}\right)$$

Eq. de la diffusion turbulente : flux turbulent proportionnel au gradient de la quantité

$$F_q(z) = -K_z \frac{\partial q}{\partial z}$$




Le monde numérique
Modèles point de grille ou spectraux, schémas numériques




Transfert entre les couches 2 et 3 par la turbulence

$$F_{2 \rightarrow 3} = K_{2 \rightarrow 3}^* (q_2 - q_3)$$



Le monde informatique
Algorithmes, boucles, langages, optimisation, adaptation aux calculateurs, post-traitements



Code informatique

```
do iv=1,nv ! Boucle sur les niveaux verticaux
do ih=1,nh ! Boucle sur la grille horizontale
Fq(ih,iv)=Kz(ih,iv)*(q(ih,iv)-q(ih,iv+1))
enddo
enddo
```

Le monde des simulations numériques

I. Modèles parmi les modèles

Des modèles numériques pour :

- Intégrer des équations dont on ne connaît pas de solution analytique
- Appréhender le système dans sa complexité (dynamique, physique, chimique ...)
- Prévoir (météorologie, pollution, climat, tsunamis, ...)
- Comprendre

Une problématique particulière :

- prédire une évolution du climat unique à partir de la connaissance du climat actuel.
- système complexe, dont on ne connaît pas a priori les éléments déterminants pour la sensibilité
- système sensible aux conditions initiales (chaos, attracteurs étranges, etc ...)

Différentes approches en termes de modélisation :

- Modèles simples pour explorer un processus particulier (modèle de Lorenz mettant en évidence la nature chaos, modèles 1D d'équilibre radiatifs, etc ...)
- **Modélisation tri-dimensionnelle réaliste.**


Modélisation 3D (celle dont on va parler ici) : Modèles de circulation générale

- De type encyclopédique
- Tentative d'exhaustivité
- Recherche du "réalisme"
- Construits à partir de principes physiques

Philosophie générale

- Définie par Charney en 1950 : travailler avec des modèles incomplets et imparfaits et les améliorer pas à pas.

II. Les modèles de circulation générale



Dynamique des fluides sur la sphère

- Conservation de la masse
 $D\rho/Dt + \rho \operatorname{div}\underline{U} = 0$
- Conservation de la température potentielle
 $D\theta / Dt = Q / Cp (p_0/p)^\kappa$
- Conservation de la quantité de mouvement
 $D\underline{U}/Dt + (1/\rho) \operatorname{grad}p - g + 2 \underline{\Omega} \wedge \underline{U} = \underline{F}$
- Conservation des composants secondaires
 $Dq/Dt = Sq$

Passage au monde numérique : modèles en points de grille et modèles spectraux.


Résolu jusqu'à une certaine échelle :

→ typiquement qq 100 km pour les modèles globaux de climat

→ quelques dizaines de m à qq km pour des modèles régionaux ou des études de processus.

Remarques sur l'acronyme MCG ou GCM : Modèles de climat global ou de circulation générale

II. Les modèles de circulation générale



Dynamique des fluides sur la sphère

- Conservation de la masse
 $D\rho/Dt + \rho \operatorname{div}\underline{U} = 0$
- Conservation de la température potentielle
 $D\theta / Dt = Q / C_p (p_0/p)^\kappa$
- Conservation de la quantité de mouvement
 $D\underline{U}/Dt + (1/\rho) \operatorname{grad}p - g + 2 \underline{\Omega} \wedge \underline{U} = \underline{F}$
- Conservation des composants secondaires
 $Dq/Dt = Sq$

Passage au monde numérique : modèles en points de grille et modèles spectraux.

Résolu jusqu'à une certaine échelle :


→ typiquement qq 100 km pour les modèles globaux de climat

→ quelques dizaines de m à qq km pour des modèles régionaux ou des études de processus.




II. Les modèles de circulation générale

Dynamique des fluides : équations de bases discrétisées sur la sphère



- Conservation de la masse
 $D\rho/Dt + \rho \operatorname{div}\underline{U} = 0$
- Conservation de la température potentielle
 $D\theta / Dt = Q / C_p (p_0/p)^\kappa$
- Conservation de la quantité de mouvement
 $D\underline{U}/Dt + (1/\rho) \operatorname{grad}p - g + 2 \underline{\Omega} \wedge \underline{U} = \underline{F}$
- Conservation des composants secondaires
 $Dq/Dt = Sq$

Dans une colonne du modèle ...




Objet des paramétrisations : rendre compte de l'effet des processus non résolus par ces équations

→ Termes « sources » additionnels dans les équations.

II. Les modèles de circulation générale

Dans une colonne du modèle ...



Paramétrisation de la turbulence



→ « **Mélange turbulent** » ou diffusion turbulente.
Transport par des petits mouvements aléatoires.
Analogue à la diffusion moléculaire.

$$Dq/Dt = Sq \quad \text{avec} \quad Sq_z = \frac{\partial}{\partial z} \left(K_z \frac{\partial q}{\partial z} \right)$$

→ Longueur de mélange de Prandtl : $K_z = l|w|$
 l : longueur caractéristique des mouvements
 w : vitesse caractéristique

→ Energie cinétique turbulente : $K_z = l\sqrt{e}$

$$De/Dt = f(dU/dz, d\theta/dz, e, \dots)$$

$$Dl/dt = \dots$$

Les mêmes modèles sont utilisés en sciences de l'ingénieur
Lois de similitudes → Tests à des échelles différentes en laboratoire

Un monde en soi ...



II. Les modèles de circulation générale

Un exemple de processus sous-maille : l'écoulement sur les reliefs

- Le **relief moyen de la surface** intervient dans le noyau dynamique comme une condition à la limite inférieure
- Ce relief moyen ne rend pas compte de la barrière que représentent les montagnes les plus hautes pour l'écoulement
- Exemple simple de paramétrisation possible : introduction d'un terme de freinage dans les basses couches de l'atmosphère.

$$\frac{DU}{Dt} + (1/\rho) \text{grad}p - g + 2 \underline{\Omega} \wedge \underline{U} = \underline{F}$$

$$\underline{F} = -a(z) \underline{U}$$



Dans les modèles actuels, on rend compte en plus :

- du freinage dans les basse couches



II. Les modèles de circulation générale

Un exemple de processus sous-maille : l'écoulement sur les reliefs

- Le **relief moyen de la surface** intervient dans le noyau dynamique comme une condition à la limite inférieure
- Ce relief moyen ne rend pas compte de la barrière que représentent les montagnes les plus hautes pour l'écoulement
- Exemple simple de paramétrisation possible : introduction d'un terme de freinage dans les basses couches de l'atmosphère.

$$\frac{DU}{Dt} + (1/\rho) \text{grad}p - g + 2 \underline{\Omega} \wedge \underline{U} = \underline{F}$$

$$\underline{F} = -a(z) \underline{U}$$



Dans les modèles actuels, on rend compte en plus de :



- du freinage dans les basse couches
- de l'injection d'ondes (de gravité) dans l'atmosphère → freinage plus haut dans l'atmosphère
- de l'effet de détournement du relief
- d'un effet de de détournement lié à la compression verticale de la vorticité au dessus des reliefs
- de l'effet de la stabilité de l'atmosphère (franchissement plus facile dans une atmosphère moins stratifiée)

II. Les modèles de circulation générale




- Calcul de l'effet collectif des processus non résolus sur les variables d'état explicites (\underline{U} , θ , q) du modèle global
- description physique approchée du comportement collectif des processus
- qui fait intervenir des variables internes aux paramétrisations (caractéristiques des nuages, écart-type de la distribution sous-maille d'une variable, ...)
- dérivation d'équations reliant ces variables internes aux variables d'état \underline{U} , θ , q à l'instant $t \rightarrow$ variables internes $\rightarrow \underline{E}$, Q , $Sq \rightarrow \underline{U}$, θ , q à $t+\delta t$
- hypothèses d'homogénéité (statistique) horizontale des processus représentés (comme dans l'hypothèse plan parallèle du transfert radiatif)
 - \rightarrow Equations uni-dimensionnelles en z (échanges verticaux)
 - \rightarrow Colonnes atmosphériques indépendantes

Dans une colonne du modèle ...



II. Les modèles de circulation générale



Dynamical core :

Well established physics and equations. Work on approximations, numerics, HPC

Parameterizations :


Based on combinations of theories, heuristic approaches, and conservation laws. Many ways possible. Strong diversity across models

General comments :

- Modeling concerns all the layers. Lot of expert knowledge required and shared.
- Be aware of the layer in which you are working, or at which transition between layers.¹²
- Do not forget that your goal is to explain things in the first layer

II. Les modèles de circulation générale

Le modèle couplé "Système Terre" de l'IPSL



Des modèles développés

- au fil du temps (dizaines d'années)
- équipes (5-10 équipes de 5-20 personnes) autour d'un même modèle de climat.
- Avec un aller retour constant entre développement et évaluation.

Philosophie générale (Définie par Charney en 1950) :

- travailler avec des modèles incomplets et imparfaits et les améliorer pas à pas.

II. Les modèles de circulation générale

1980 – 2010 Priority given to model complexification


Motivated by long term climate variations and CO2 cycle
Easier to promote new components than improvements of « as usual business »

Not much improvement on model physics while :

- strong biases persist
- atmospheric physics (in particular clouds) are of first order for climate sensitivity to greenhouse gases
- Importance des paramétrisations dans toutes les composantes
- Le couplage en lui même est un enjeu de modélisation


La question du découpage et du raccordement de sous-système est partout. Questions physiques et numériques

- Garantir la conservation de l'eau ou de l'énergie dans le système n'est ... pas trivial ...
- Besoin d'une « culture de la modélisation » pour progresser




III. Les modèles et leurs utilisations

Image météosat







Simulation des nuages sur un mois
Avec le modèle LMDZ, résolution horizontale 50km
Modèles de climat = modèles de prévisions météo



Expérience type Lorenz avec le modèle du LMD

Perturbation de 0.1°C des températures initiales.





- Ouagadougou, simulation de contrôle
- Nevers, simulation de contrôle
- Ouagadougou, état initial perturbé
- Nevers, état initial perturbé

Comment prévoir le climat si on ne prévoit pas la météo à 15 jours ?

Personnes se promenant dans un chemin


ou ... billes lancées du haut d'un toboggan aquatique

ou ... évolution de la température à Paris sur 1 an




III. Les modèles et leurs utilisations


	Climate modeling	Numerical Weather Forecast
Models	Identical (more couplings)	Identical (higher resolution)
Initial state	any	“analysis” obtained from an “assimilation” of observations within a model.
Simulation length	decades to centuries	15 days (Seasonal forecast in between)
Prediction	statistical (ex : mean temperature, internal variability of precipitation, heat waves) Strange attractor = climate	deterministic (the weather tomorrow at a given location)




température globale (°C)




anomalie globale (°C)



anomalie globale (°C)




température été France (°C)



III. Simulations du changement climatique

Les modèles prévoient dès 1980 l'évolution des températures



III. Simulations du changement climatique

modèles climatiques = modèles de prévisions du temps

Comment utilise-t-on des modèles

1) imparfaits

**2) incapables de prévoir la météorologie au-delà de 15 jours
pour prévoir le changement climatique ?**

En sachant ce qu'il y a dans le modèle

En analysant statistiquement des simulations longues

En suivant rigoureusement des protocoles très précis


En vérifiant les capacités du modèle à reproduire le climat passé

Illustrations tirées de Hourdin et Guillemot, Universalis

Disponible sur

<https://www.lmd.jussieu.fr/~hourdin/PEDAGO/>

Donner les bases sur pour ne pas utiliser les modèles comme des boites noires



Dynamique des fluides : équations de bases discrétisées sur la sphère

- Conservation de la masse
 $D\rho/Dt + \rho \operatorname{div}\underline{U} = 0$
- Conservation de la température potentielle
 $D\theta / Dt = Q / Cp (p_0/p)^\kappa$
- Conservation de la quantité de mouvement
 $D\underline{U}/Dt + (1/\rho) \operatorname{grad}p - g + 2 \underline{\Omega} \wedge \underline{U} = \underline{F}$
- Conservation des composants secondaires
 $Dq/Dt = Sq$

+

Paramétrisations physiques : Q, \underline{F}, Sq

+

Couplages + HPC + calibration (tuning) + évaluation + utilisation ...

Aujourd'hui :

1/ Coordonnées sphériques

2/ Advection/conservation : $Dq/Dt = 0$